


SINTESI CONSUMO SOSTANZE STUPEFACENTI NEGLI STUDENTI 15 -19 ANNI (PROVINCIA DI BRESCIA)

Elenco Scuole	Denominazione
BSPM01500N	L.L. "E. MEDI"
BSPM04000A	I.M. "LICEO VIA BONINI, 58"
BSPS01103C	L.S. "VEROLANUOVA (SEZ.ASS.IS"PASCAL"MANERBIO)"
BSPS02401C	L.S. "LUNARDI"
BSPS025007	L.S. "PARITARIO LUZZAGO"
BSPS05000X	L.S. "ENRICO FERMI"
BSPS11500D	L.S. "PIAMARTA"
BSRA02203C	I.P.A.A. "ORZIVECCHI(SEZ.ASS.I.S."DANDOL O"CORZANO)"
BSRC00401Q	I.P.S.C. "SEZ.ASS. PERLASCA"
BSRH004011	I.P.S.S.A.R. "SEZ.ASS. "PERLASCA" IDRO"
BSSL011017	I.S.S. "B. PASCAL"
BSTD00101G	I.T.C. "PISOGNE"
BSTD003017	I.T.C. "DESENZANO SEZ.ASS.I.S."BAZOLI""
BSTF04000B	I.T.I.S. "CEREBOTANI"
BSTF04500E	I.T.I. "PARITARIO ARTIGIANELLI"
BSTL01000Q	I.T.S.G. "NICOLO' TARTAGLIA"



	Maschi		Femmine		Totale	
	Prov.	Italia	Prov.	Italia	Prov.	Italia
Consumo di qualsiasi sostanza stupefacente illegale 15-19 anni(*) (%)						
Almeno una volta nella vita (LTP)	31,8	29,5	29,7	22,1	30,8	25,8
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP)	25,7	24,8	22,2	17,8	24,0	21,3
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP)	16,4	17,2	12,3	11,7	14,4	14,4
Sostanza (%) (almeno una volta nella vita)						
Tranquillanti o sedativi (senza prescrizione medica o indicazione dei genitori)	3,0	2,3	7,4	4,0	5,1	3,1
Amfetamine	1,8	1,2	0,7	0,8	1,2	1,0
Ecstasy	2,6	1,6	1,2	1,0	1,9	1,3
Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	2,2	2,6	1,7	2,2	2,0	2,4
Cannabis (Marijuana o hashish)	28,7	26,9	23,4	18,3	26,2	22,6
LSD	3,5	1,8	1,5	0,8	2,6	1,3
Crack	0,8	1,2	0,9	0,7	0,8	0,9
Cocaina	2,4	2,8	1,4	1,5	1,9	2,2
Eroina	0,5	0,6	0,2	0,4	0,3	0,5
Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	1,9	1,4	0,9	0,9	1,4	1,2
Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescalina, sintetici)	3,0	2,8	1,2	1,3	2,2	2,1
GHB (ecstasy liquida)	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3
Steroidi anabolizzanti	0,6	0,7	0,2	0,2	0,4	0,5
Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	1,4	1,3	0,0	0,7	0,7	1,0
Cannabis in associazione con alcol per sballare	16,7	16,3	11,6	10,5	14,2	13,4
Alcol in associazione con farmaci (pasticche) per sballare	1,4	1,4	2,2	1,5	1,8	1,4

(*) amfetamine, ecstasy, sostanze inalanti, cannabis, LSD, crack, cocaina, eroina, altri oppiacei, altri allucinogeni, GHB, steroidi anabolizzanti, altre sostanze

	Prov.	Italia	Maschi Differenza %
Consumo di qualsiasi sostanza stupefacente illegale 15-19 anni(*) (%)			
Almeno una volta nella vita (LTP)	31,8	29,5	7,8%
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP)	25,7	24,8	3,6%
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP)	16,4	17,2	-4,7%
Sostanza (%) (almeno una volta nella vita)			
Tranquillanti o sedativi (senza prescrizione medica o indicazione dei genitori)	3,0	2,3	30,4%
Amfetamine	1,8	1,2	50,0%
Ecstasy	2,6	1,6	62,5%
Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	2,2	2,6	-15,4%
Cannabis (Marijuana o hashish)	28,7	26,9	6,7%
LSD	3,5	1,8	94,4%
Crack	0,8	1,2	-33,3%
Cocaina	2,4	2,8	-14,3%
Eroina	0,5	0,6	-16,7%
Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	1,9	1,4	35,7%
Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescalina, sintetici)	3,0	2,8	7,1%
GHB (ecstasy liquida)	0,2	0,4	-50,0%
Steroidi anabolizzanti	0,6	0,7	-14,3%
Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	1,4	1,3	7,7%
Cannabis in associazione con alcol per sballare	16,7	16,3	2,5%
Alcol in associazione con farmaci (pasticche) per sballare	1,4	1,4	0,0%

(*) amfetamine, ecstasy, sostanze inalanti, cannabis, LSD, crack, cocaina, eroina, altri oppiacei, altri allucinogeni, GHB, steroidi anabolizzanti, altre sostanze

	Prov.	Italia	Femmine Differenza %
Consumo di qualsiasi sostanza stupefacente illegale 15-19 anni(*) (%)			
Almeno una volta nella vita (LTP)	29,7	22,1	34,4%
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP)	22,2	17,8	24,7%
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP)	12,3	11,7	5,1%
Sostanza (%) (almeno una volta nella vita)			
Tranquillanti o sedativi (senza prescrizione medica o indicazione dei genitori)	7,4	4,0	85,0%
Amfetamine	0,7	0,8	-12,5%
Ecstasy	1,2	1,0	20,0%
Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	1,7	2,2	-22,7%
Cannabis (Marijuana o hashish)	23,4	18,3	27,9%
LSD	1,5	0,8	87,5%
Crack	0,9	0,7	28,6%
Cocaina	1,4	1,5	-6,7%
Eroina	0,2	0,4	-50,0%
Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	0,9	0,9	0,0%
Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescalina, sintetici)	1,2	1,3	-7,7%
GHB (ecstasy liquida)	0,3	0,2	50,0%
Steroidi anabolizzanti	0,2	0,2	0,0%
Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	0,0	0,7	-100,0%
Cannabis in associazione con alcol per sballare	11,6	10,5	10,5%
Alcol in associazione con farmaci (pasticche) per sballare	2,2	1,5	46,7%

(*) amfetamine, ecstasy, sostanze inalanti, cannabis, LSD, crack, cocaina, eroina, altri oppiacei, altri allucinogeni, GHB, steroidi anabolizzanti, altre sostanze

	Prov.	Italia	Totale Differenza %	
Consumo di qualsiasi sostanza stupefacente illegale 15-19 anni(*) (%)				
Almeno una volta nella vita (LTP)	30,8	25,8	19,4%	
Una o più volte negli ultimi 12 mesi (LYP)	24,0	21,3	12,7%	
Una o più volte negli ultimi 30 giorni (LMP)	14,4	14,4	0,0%	
Sostanza (%) (almeno una volta nella vita)				
Tranquillanti o sedativi (senza prescrizione medica o indicazione dei genitori)	5,1	3,1	64,5%	
Amfetamine	1,2	1,0	20,0%	
Ecstasy	1,9	1,3	46,2%	
Sostanze inalanti (colle, solventi, popper)	2,0	2,4	-16,7%	
Cannabis (Marijuana o hashish)	26,2	22,6	15,9%	
LSD	2,6	1,3	100,0%	
Crack	0,8	0,9	-11,1%	
Cocaina	1,9	2,2	-13,6%	
Eroina	0,3	0,5	-40,0%	
Altri oppiacei (metadone, morfina, codeina)	1,4	1,2	16,7%	
Altri allucinogeni (funghi allucinogeni, ketamina, mescalina, sintetici)	2,2	2,1	4,8%	
GHB (ecstasy liquida)	0,2	0,3	-33,3%	
Steroidi anabolizzanti	0,4	0,5	-20,0%	
Altre sostanze (smart drug, salvia divinorum)	0,7	1,0	-30,0%	
Cannabis in associazione con alcol per sballare	14,2	13,4	6,0%	
Alcol in associazione con farmaci (pasticche) per sballare	1,8	1,4	28,6%	

(*) amfetamine, ecstasy, sostanze inalanti, cannabis, LSD, crack, cocaina, eroina, altri oppiacei, altri allucinogeni, GHB, steroidi anabolizzanti, altre sostanze